



NEUROPATHISCHE PIJN BIJ ADHESIVE ARACHNOIDITIS

Neuropathische pijn ontstaat wanneer bio-elektriciteit wordt geblokkeerd en zich ophoopt in beschadigde zenuwen, waardoor normale geleiding niet kan plaatsvinden. AA is een inflammatoire-adhesieve massa die de zenuwwortels van de cauda equina insluit en normale bio-elektrische geleiding naar benen, voeten, blaas, darmen en geslachtsorganen verhindert. Hierdoor kan neuropathische pijn ernstig zijn bij AA en moet deze behandeld worden.

Hoe zenuwen bio-elektriciteit geleiden

Bio-elektriciteit wordt geleid door receptoren (“actiepunten”) in zenuwen, genaamd gamma amino boterzuur (GABA). Deze receptor wordt geactiveerd door een neurotransmitter met dezelfde naam. Wanneer de GABA-receptor wordt geactiveerd, laat deze bio-elektriciteit door en wordt pijn verlicht. Neuropathische middelen activeren of stimuleren de GABA-receptor.

Neuropathische pijn is licht, matig of ernstig

AA kan ernstige neuropathische pijn veroorzaken omdat zenuwen ingesloten raken.

Bijwerkingen van neuropathische middelen

Deze middelen kunnen allemaal sedatie veroorzaken, vooral wanneer ze samen met opioïden worden gebruikt. Ze kunnen worden misbruikt, daarom gelden er beperkingen voor hun gebruik.

<u>HUIDIGE BEHANDELINGSMIDDELEN</u>		
<u>Milde/Matige pijn</u>	<u>Ernstige pijn</u>	<u>Medicinale kruiden</u>
Gabapentine Pregabalin (Lyrica®) Baclofen	Diazepam (Valium®) Alprazolam (Xanax®) Carisoprodol (Soma®) Topiramate (Topamax®)	KAVA Ashwaghandha Valeriaan wortel

Gedwongen afbouw

Sommige patiënten worden gedwongen te stoppen met benzodiazepinen, Valium of Xanax. In dit geval kan een combinatie van KAVA en Ashwaghandha een vervanging bieden.

Samenvatting

Een persoon met constante onbehandelbare pijn zal een middel nodig hebben voor ascenderende, descenderende en neuropathische pijn.