

HET PATHOLOGISCHE PAD NAAR ADHESIVE ARACHNOIDITIS (AA)

	UITLOKKENDE GEBEURTENIS ⁺		VERHOOGDE RISICO'S OP
A	Trauma	A	Erfelijke bindweefsel aandoening
B	Infecties	B	Auto-immuun ziekte
C	Verstoring in de CSF-doorstroming	C	Anatomische afwijking van de wervelkolom

Immuun Systeem Aangetast



Ebstein-Barr Virus Geheractiveerd*



1. Virale weefselinfiltratie
2. Auto-immuniteit
 - a. Auto-antilichamen
 - b. Cellulaire kruisreactiviteit



**Ontsteking en verkleaving vormen
in de cauda equina en het
arachoïdemembraam**



ADHESIVE ARACHNOIDITIS

+ Trauma, infectie of besmetting van hersen- en ruggenmergvloeistof die de lumbaal-sacrale wervelkolom ernstig aantast, kan in eerste instantie virale reactivatie en auto-immuniteit omzeilen en AA veroorzaken. Virale reactivatie zal echter meestal later optreden en de ontwikkeling van AA versnellen.

* Andere virussen en sommige bacteriën kunnen ook opnieuw actief worden en/of gepaard gaan met en de reactivatie van EBV versterken.

You can join our weekly podcast DokToks on LinkedIn, X, or Facebook.
Links are provided on this site. <https://linktr.ee/DocToks>