



OORZAKEN VAN VERSLECHTERING IN ADHESIVE ARACHNOIDITIS (AA)

Herkenning van verslechtering

Zwakte in de benen of voeten, verminderde controle over blaas of darmen, moeilijk te stoppen pijnaanvallen, ongewone huidsensaties, branderig gevoel in de voeten.

Oorzaak nr. 1: De ziekte verergert

De ziekte verergert en er is meer ontsteking in de zenuwwortels van de cauda equina. Opmerking: De beste behandeling om verslechtering te voorkomen is, volgens onze ervaring, een lage dosis, intermitterend (1 tot 3 keer per week) methylprednisolon en ketorolac.

Oorzaak nr. 2: Hormoontekort

Pijn, AA en opioïden kunnen allemaal een hormoontekort veroorzaken aan cortisol, DHEA, pregnenolone, progesteron, estradiol en/of testosteron. Een bloedtest zal een tekort en de noodzaak tot suppletie vaststellen. Opmerking: Een beproefde methode om hormoontekort te voorkomen is het dagelijks gebruik van pregnenolone en/of DHEA, 100 tot 200 mg, aangezien deze twee hormonen alle andere aanmaken.

Oorzaak nr. 3: Reactivatie van het Epstein-Barr-virus (EBV)

De nieuwe bloedtest voor EBV bepaalt of u auto-immuun complicaties heeft en/of het virus is gereactiveerd, wat leidt tot ontsteking van de cauda equina, pijn en verslechtering. Protocollen voor zowel EBV-auto-immuniteit als reactivatie staan op onze website.

Eerste stap bij verslechtering

Een Medrol-kuur van 6 dagen wordt aanbevolen als eerste stap om verslechtering te stoppen. Als de symptomen verbeteren met de kuur, geeft dit aan de patiënt en de arts dat een krachtigere ontstekingsremmende/auto-immuun behandeling nodig is.

Protocol voor verslechtering

Arachnoiditis Hope heeft een zogenaamd "Omkeerprotocol" ontwikkeld om verslechtering te stoppen. Dit is een proefperiode van 3 weken met 3 verschillende, vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Beschikbaar op aanvraag.