




STOP VERSLECHTERING

Eerste behandelingsdoel van Adhesive Arachnoiditis (AA)

Verslechteringstijd (VT) is de periode tussen het begin van de ziekteverschijnselen en het overlijden. Historisch gezien zijn gegevens over AA schaars, maar rapporten schatten deze periode op ongeveer 4 tot 10 jaar. Verslechtering kan worden omschreven als: erger worden, achteruitgaan, aftakelen, afnemen, verzwakken, desintegreren, verslechteren, in waarde verminderen, beschadigen, terugvallen. Iedere persoon met AA kan de woorden kiezen die het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie passen.

HET VERSLECHTERINGSPAD VAN AA



TERMINALE DOODSOORZAAK: bijnier falen, sepsis, hartstilstand

DOELEN VAN DE BEHANDELING: Het doel van de behandeling van AA is het stoppen of vertragen van de verslechtering, aangezien genezing nog niet bekend is. De behandeling is er niet alleen op gericht het leven te verlengen, maar ook om de kwaliteit van leven te verbeteren en lijden en ellende te verlichten.

HET GOEDE NIEUWS: Wees er duidelijk van bewust dat de achteruitgang bij AA kan worden vertraagd of zelfs gestopt met een behandelplan dat meerdere maatregelen omvat.

You can join our weekly podcast DokToks on LinkedIn, X, or Facebook.
Links are provided on this site. <https://linktr.ee/DocToks>